



โรคฝีดาษลิง

MONKEYPOX

ติดต่อจากสัตว์สู่คน
เลือด สารคัดหลั่ง
ตุ่มหนองของสัตว์



รวมทั้งติดต่อจากคนสู่คน โดยสัมผัสสารคัดหลั่ง
สัมผัสแผลหรือใช้ของร่วมกันกับผู้ติดเชื้อโดยตรง
และสามารถแพร่เชื้อจากหญิงตั้งครรภ์สู่ทารกในครรภ์ได้



แบ่งเป็น 4 ระยะ ได้แก่

1. ระยะฟักตัว จะไม่แสดงอาการช่วง 5 - 21 วันหลังจากได้รับเชื้อ
2. ระยะไข้ 1 - 4 วัน มีอาการปวดหัว เจ็บคอ หนาวสั่น อ่อนเพลีย และต่อมน้ำเหลืองโตร่วมด้วย
3. ระยะผื่น 1 - 2 สัปดาห์ จะเริ่มจากผื่นแบน ผื่นนูน ผื่นมีน้ำใสใต้ผื่น ผื่นมีน้ำขุ่นใต้ผื่น จนกระทั่งเป็นผื่นแผลแห้งเป็นขุย
4. ระยะฟื้นตัว ใช้เวลาหลายวันจนถึงหลายสัปดาห์

ป้องกันตนเอง

1. หลีกเลี่ยงสัมผัสโดยตรงกับเลือด สารคัดหลั่งและตุ่มหนองของสัตว์
2. กั้นเนื้อสัตว์ปรุงสุก
3. หมั่นล้างมือบ่อย ๆ
4. ไม่ควรกินเนื้อสัตว์ป่า และไม่นำสัตว์ป่ามาเลี้ยง

